TUBE SEC AVEC GEL (sans anticoagulant)
6 retournements lents

PROTEINES SERIQUES

Préalb, Alb, CST, Lipase, LDH — 1 tube

Transferrine carboxy-déficiente, CTX (cross laps) — 1 tube

Electro et immuno électrophorèse des prot — 2 tubes

HORMONES/ FERRITINE/vitamines :

FSH, LH, Prolactine, Estradiol, Progestérone, vit B12, folates

TSH, T3, T4, cortisol, ferritine, VitD — 1 ou 2 tubes

AUTO-IMMUNITE :

ACAN, AC antithyroïdiens, fact rhumat., CCP — 1 tube

ALLERGIE :

IgE, RAST, Phadiatop, CLA, Trophatop — 1 tube

MEDICAMENTS* : — 1 tube

(sauf ciclosporine ou autre anti-rejet sur EDTA mauve)

SEROLOGIES VIRALES:

HIV, CMV, hépatites A/B/C, EBV (mononucléose), RUB

SEROLOGIES PARASITAIRE : TOXOPLASMOSE …

SEROLOGIES BACTERIENNES : BW, mycoplasmes, chlamydia, ASL-ASD, Lyme — 2 tubes

MARQUEURS : AFP, ACE, CA15.3, CA19.9, CA125, PSA, — 2 tubes

HCG ou DIAG. Grossesse — 2 tubes

TUBE CITRATE
3 à 4 retournements lents

TP/INR

TCK

FIBRINOGENE — 1 tube

FACTEURS de coagulation : Protéine C, Protéine S, — 1 tube/facteur

ANTI THROMBINE III

HEPARINEMIE

Activité Anti Xa — 1 tube

A congeler dans l'heure

Attention de bien respecter le niveau de remplissage des tubes citratés ! remplissage lent.

Ne jamais prélever de tube citraté à la suite d'un tube contenant un autre anticoagulant : risque d'interférences !

TUBE HEPARINATE DE LITHIUM
8 à 10 retournements lents

BIOCHIMIE / ENZYMES

cholesterol, HDL, LDL, triglycérides, urée, glycémie (si < 2h), créatinine, ac.urique, bilirubine, Ca, phosphore, Fe, CRP

SGOT, SGPT, GGT, PAL, CPK

Iono : Na, K, Chlore, réserve alcaline.

1 tube

TUBE NOIR
(effilé) 8 à 10 retournements lents
Citrate de sodium

VS : Vitesse de sédimentation

Remplir impérativement le tube et laisser la visibilité du tube (étiquette sur le bas du tube)

TUBE EDTA
8 à 10 retournements lents

NUMERATION FORMULE PLAQUETTES

Paludisme : goutte épaisse

VS (si pas tube spécial) — 1 tube

Réticulocytes — 1 tube

CICLOSPORINE* ou autre anti-rejet — 1 tube

Hémoglobine glyquée = HA1C — 1 tube

GROUPE SANGUIN PHENOTYPE RAI — 1 tube

DDimères — 1 tube

Troponine, myoglo

BNP PTH — 1 tube

TUBE GRIS
fluorure de sodium
8 à 10 retournements lents

Glycémie isolée ou si délai > 2 heures

COPIE MISE A JOUR NON CERTIFIEE

* **MEDICAMENTS** : pensez à noter nom, dose et heure de la dernière prise médicamenteuse

✓ Veillez au bon remplissage des tubes et dans l'ordre préconisé : citraté puis gel puis hépariné puis EDTA puis fluorure

Se renseigner auprès du laboratoire pour toute analyse particulière. Site www.biomnis.com pour analyses spécialisées