

Rédacteur	Vérificateur	Approbateur	Date d'application
Isabelle Barlier	Vanessa Dazzan	Isabelle Barlier	19/12/16
06/12/16	06/12/16	06/12/16	

Action :	Date :	Par :	Objet :
Création	<b>06.12.16</b>	<b>Isabelle Barlier</b>	<b>création</b>
Révision			

## 1. Objet et domaine d'application

Cette fiche d'instruction décrit les mesures à prendre pour réaliser un test au Dectansyl®.

## 2. Documents associés

C2 - PR 01 « Procédure de Prélèvements »  
C2 - MO01 « Prélèvements sanguins »

## 3. Responsabilités

Les prélèvements sont réalisés sous la responsabilité du biologiste et sont pratiqués par le personnel autorisé (C2 - PR 01 « Procédure de Prélèvements »).

## 4. Protocole

But du test : mise en évidence d'un hypercorticisme

Préconisations à donner au patient :

- prendre un RDV pour 8h au laboratoire
- vérifier que le patient a bien les comprimés de dexaméthasone (Dectancyl®) : 2cp de 0,5 mg
- être à jeun

Réalisation du test :

- Ingestion des comprimés de dexaméthasone à 23h (ou minuit selon prescription)
- prélèvement à 8h (+/- 30 minutes) : dosage du cortisol (+/- ACTH si demandée)

## 5. Classement et archivage

Sans objet